

Influenza Horse

Vacuna contra la Influenza Equina

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Es una suspensión conteniendo virus de la Influenza Equina cepa A/equine 1/Praga/56, A/equine/2/Kentucky/94, A/equine 2/South Africa 04/03 inactivados por betapropilolactone y adsorbidos por el gel de hidróxido de aluminio.

INDICACIONES:

Prevención de la influenza de los équidos.

DOSIS:

La dosis indicada es 2 mL, cualquier que sea la edad y peso de équidos.

MODO DE USO:

El producto debe ser aplicado vía intramuscular profunda en la tabla del cuello, observándose los cuidados de asepsia en el local de la inyección.

Animal adulto no vacunado: 1 dosis inicial y refuerzo 30 días después.

Potros: aplicar a partir de los 3 meses de edad. Utilizar 3 dosis con intervalo de 2 a 4 semanas entre ellas.

Animal adulto ya vacunado: revacunación semestral.

Revacunación semestral o a criterio del médico veterinario. Llevar en consideración la probabilidad de exposición a los agentes, condiciones epidémicas y estrés del animal.

Hembras preñadas: vacunar según recomendación y acompañamiento del médico veterinario.

PRECAUCIONES DE USO:

No vacunar animales enfermos, debilitados, convalescentes, con deficiencias nutricionales, sometidos a estrés o con una alta carga parasitaria, porque esos factores comprometen el establecimiento de una inmunidad sólida y duradera. Esta vacuna es preventiva y no curativa. La vacunación no protege contra infecciones ya existentes, porque es necesario un plazo de 21 días después a administración de la última dosis para la formación de la inmunidad. El uso concomitante con sustancias antiinflamatorias o antimicrobianas, podrá interferir en el desarrollo y manutención de la respuesta inmune después de la vacunación. El uso de cualquier producto biológico puede producir reacciones anafilácticas. En este caso

Nº 166-1 ESP

administrar el sulfato de epinefrina o de atropina. Conservar el producto entre 2 °C y 8 °C. Verificar la fecha de vencimiento antes de administrar la vacuna. No utilizar vacunas que tengan la fecha de validez expirada. Los frascos vacíos deben ser incinerados después del uso. No almacenar la vacuna después de abierta. Agitar el frasco antes y durante la utilización de la vacuna. Vencimiento: 24 meses después de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN:

Frascos plásticos o vidrio de 20 mL (10 dosis). Frasco ampolla de 2 mL (1 dosis), acondicionado en caja con 1 o 5 o 10 o 20 o 50.

Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del médico veterinario. Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario.

Licenciado en el Ministério da Agricultura bajo nº 9.147 en 19/09/05.

Importado por:

Invet S.R.L. – R.U.C. 80028993 – 5 – Dirección: AVDA Fernando de la Mora, 3.488, c/ Cacique Lambare – Paraguay – Registro nº 7.965 – Responsable Técnico: Dr. Carlos Alberto Bresanovich Enciso, nº Registro Profesional: 449.

Reg. Senacsa Paraguay nº 10.038.

Propietario y fabricante:

Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda.
Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Industrias Leves
CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brasil
CNPJ: 79.578.266/0001-76 - Indústria Brasileira
SAC: +55 43 3339-1350 - www.dechra.com.br
Responsable Técnica: Dr.ª Vera Lúcia Fernandes.
CRMV-PR nº 3.014.



Dechra